

Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre profesionálnych používateľov
Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre neprofesionálnych používateľov

SWIRSKII MITE

POUŽITIE V ZÁHRADÁCH A PREDZÁHRADKÁCH JE POVOLENÉ

Pomocný prípravok so živými makroorganizmami – roztoč *Amblyseius swirskii*, určený na ochranu zeleniny (okrem rajčiakov), ovocia a okrasných rastlín proti larvám rôznych druhov strapiek, vajíčkam a larvám molice skleníkovej a molice bavlníkovej.

AKTÍVNA ZLOŽKA: *Amblyseius swirskii* 100 %

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:
nerelevantné

OZNAČENIE: nepožaduje sa
Výstražné slovo sa nepožaduje

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

Výrobca: Koppert B.V.
Veilingweg 17, Postfach 155,
2650 AD Berkel en Rodenrijs
Holandské kráľovstvo
JKlapwijk@koppert.nl

Držiteľ autorizácie: bioTomal
941 36 Rúbaň č. 291
Slovenská republika
bioservis@biotomal.sk

Číslo autorizácie ÚKSÚP: **19-00493-PM**

Dátum výroby: uvedené na obale
Číslo výrobnnej šarže: uvedené na obale
Balenie: 0,5 l PET fľaša (50 000 ks)

Doba použiteľnosti: vo vhodnom transportnom papierovom obale možno skladovať 5-7 dní v chladničke pri +5 až +10 C.

PÔSOBENIE POMOCNÉHO PRÍPRAVKU

Dospelé roztoče, nymfy a larvy vyciavajú svojich hostiteľov (larvy strapiek, vajíčka a larvy molíc).

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka (ks/m ²)	Ochranná doba	Poznámka
zelenina (okrem rajčiakov), ovocie, okrasné rastliny	larvy strapiek, vajíčka a larvy molice skleníkovej a molice bavlníkovej	25-100	AT	skleníky, fóliovníky

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Upozornenie: Živý biologický materiál, aplikujte čo najskôr po obdržaní!

Počet aplikácií: 1x

Miesta s najsilnejším výskytom škodcov:

Aplikujte v dávke 100 roztočov na m² (t.j. 1 fľaša na 500 m²).

Miesta so slabým výskytom škodcov (aplikovať hneď pri výskyte strapiek a molíc):

Aplikujte v dávke 50 roztočov na m² (t.j. 1 fľaša na 1000 m²).

Preventívne (v sladkej paprike aplikujte iba pri výskyte peľu):

Aplikujte v dávke 25 roztočov na m² (t.j. 1 fľaša na 2000 m²).

Metóda aplikácie:

Pred použitím jemne otočte a pretrepte. Opatrne rozsypte roztoče na listy. Presvedčte sa, že roztoče ostanú na listoch niekoľko hodín po aplikácii. Niekoľko hodín po aplikácii nevykonávajte žiadne činnosti na rastlinách.

Roztoč *Amblyseius swirskii* nie je citlivý na diapauzu, preto môže byť nasadzovaný v zime.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

V prípade mechanického použitia môže inhalácia produktu spôsobiť senzibilizáciu. Odporúča sa ochranná maska proti prachu pre pracovníkov a ľudí pracujúcich v blízkosti aplikácie.

PRVÁ POMOC

V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Aplikujte čo najskôr po obdržaní. Po obmedzenú dobu 1-2 dní možno skladovať v tme pri teplote od + 12°C do +14°C.

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVÝŠKOV

Vyprázdnený obal vmyte vodou a likvidujte ako ostatný odpad.

Nepoužitý prípravok v pôvodnom obale a prázdne obaly z prípravku odovzdajte v mieste

zberu domového odpadu špeciálne vytvoreného pre tento účel (v rámci triedenia odpadov) príslušnou samosprávou (informujte sa u orgánu miestnej správy)! Obaly od prípravku sa nesmú znovu používať na akékoľvek iné účely!